



POXICON®

Fungicida agrícola

Suspensión Concentrada

Producto registrado: **RSCO-FUNG-0371-X0231-064-12.0**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO	
EPOXICONAZOL: (2RS,3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2,4-triazol (Equivalente a 125 g de i. a. /L a 20°C)	12.00
INGREDIENTES INERTES	
Humectante, dispersante, espesante, antiespumante y diluyente	88.00
TOTAL:	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**INSTRUCCIONES DE USO:
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

POXICON® es un fungicida con acción sistémica recomendado para el control de las plagas indicadas en cada cultivo.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Café (28)*	Roya amarilla (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.63 - 0.75	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 700 – 800 L de agua/ha.
Banano (SL)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.8– 0.9	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 6 días, iniciar las aplicaciones al inicio de la enfermedad; volumen de aplicación 650 – 750 L de agua/ha.
Soya (15)	Roya asiática de la hoja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	0.87 – 1.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas o se presenten las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Trigo (SL)	Roya del tallo (<i>Puccinia tritici</i>)	0.87 – 1.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.

*() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Café	0.05	EPA*
Banano	0.5	EPA
Soya	0.05	Unión Europea
Trigo	0.6	Unión Europea

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta, o gafas de seguridad, o lentes de seguridad para productos químicos, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre y con boquilla especial para frutales que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES. No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr.) ni a temperaturas muy altas (>35°C).

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en el cultivo y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON[®]

www.dragon.com.mx