



DRAGOCOLOR®

Herbicida agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: RSCO-HEDE-0288-302-009-075

COMPOSICION PORCENTUAL

% EN PESO

ACETOCLOR: 2-Cloro-N-etoximetil-6'-etilacet-o-toluidida
(Equivalente a 839 g de i.a./L) 75.30

INGREDIENTES INERTES

Protector, solvente, emulsificante, estabilizador y portador 24.70
TOTAL 100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN, BANDA AZUL

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DRAGOCOLOR® se recomienda para el control pre emergente de maleza de hoja angosta y hoja ancha anuales en el cultivo de AGAVE y MAÍZ.

CULTIVOS	MALEZA QUE CONTROLA		Tipo de suelo	DOSIS (L/ha)
	Hoja angosta	Hoja ancha		
Agave Maíz (SL)	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>).	Quelite o bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)	Suelos ligeros (arenosos)	1.5
	Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>).	Polocote (<i>Tithonia tuabaeiformis</i>)		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Zacate sabana (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	Chual (<i>Chenopodium album</i>)	Suelos medianos (francos o limosos)	2.0
	Zacate cola de zorra (<i>Setaria spp</i>)	Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>)		
	Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	Aceitilla (<i>Bidens pilosa, B.frondosa</i>)		
	Zacate escamoso o salado (<i>Leptochloa filiformis</i>)	Cabeza de negro (<i>Borreria asperifolia</i>)	Suelos pesados	2.5

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

Zacate ilusión (<i>Panicum trichoides</i>) Zacate triguillo (<i>Panicum mileaceum</i>) Zacate pata de gallo (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Coquillo amarillo de semilla (<i>Cyperus esculentus</i>)	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Chicalote (<i>Argemone mexicana</i>) Flor blanca (<i>Richardia escabra</i>)		
--	--	--	--

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Agave	0.01	EPA*
Maíz	4.5	EPA

*Environmental Protection Agency

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

La dosis recomendada de **DRAGOCLOR®** debe disolverse en suficiente agua para lograr un cubrimiento total y uniforme del terreno. Para aspersiones terrestres, se recomienda un volumen de aspersión de 300-400 litros de agua/ha en cobertura total. Esto se logra utilizando boquillas TJ-8003 o TJ-8004, en un volumen proporcional a la superficie tratada. No se recomiendan aspersiones aéreas de este producto.

ÉPOCA DE APLICACIÓN. El suelo a tratar debe estar bien preparado y libre de terrones grandes. Aplicar **DRAGOCLOR®** inmediatamente después de la siembra, antes de la emergencia de la maleza y del cultivo. Una vez emergida del suelo, la maleza no es controlada por **DRAGOCLOR®**. La lluvia o riego posterior a la aplicación es necesaria para activar el producto. El control puede resultar deficiente si la aplicación se realiza sobre suelo seco.

CONTRAINDICACIONES.

Es conveniente retrasar las escardas mecánicas en el área tratada con **DRAGOCLOR®** el mayor tiempo posible. En caso de emergencia de maleza o agrietamiento del suelo, donde exista necesidad de cultivar, se recomienda realizar la escarda en forma superficial para no mezclar suelo no tratado con suelo tratado. No permitir el paso de personas o animales a campos recién tratados con este herbicida. No aplique en contra del viento o con vientos mayores a 10 km/hr para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles.

FITOTOXICIDAD: **DRAGOCLOR®** no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. **DRAGOCLOR®** es compatible con otros herbicidas e insecticidas aplicados al suelo. Sin embargo, antes de mezclar **DRAGOCLOR®** con cualquier otro plaguicida o fertilizante se recomienda realizar una prueba de mezclado con pequeñas cantidades antes de usarlo en forma comercial. La mezcla de **DRAGOCLOR®** puede realizarse únicamente con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx