



## ACTRAM 75 WDG®

Insecticida agrícola

Gránulos dispersables

Producto registrado: **RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>TIAMETOXAM:</b> (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina (Equivalente a 750 g de i.a./Kg)	75.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	25.00
Adhesivo, humectante, agente penetrante y carga.	100.00
<b>TOTAL</b>	

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**ACTRAM 75 WDG®** es un insecticida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Papa (SL) Jitomate (SL) Tomate de cáscara (SL) Chile (SL)	Pulgón saltador ( <i>Paratrioza cockerelli</i> ) Pulgón verde ( <i>Myzus persicae</i> )	200 – 800	Realizar dos aspersiones al follaje, la primera a los 5 días después del transplante; la segunda aplicación a los 14 días después de la primera. Volumen de aplicación 550-650 L/ha.
Pepino, (SL) Calabaza, (SL) Calabacita, (SL) Chayote, Melón(SL) Sandía (SL)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ) Pulgón ( <i>Aphis gossypii</i> )	120 – 200	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 322 - 422 L de agua / ha

### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



Aguacatero (SL)	Trips ( <i>Scirtothrips perseae</i> ) Agalla de la hoja ( <i>Trioza anceps</i> ) Chicharrita del aguacate ( <i>Idona minuenda</i> )	140 – 200	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 1650 - 1805 L de agua / ha
Limonero, Cidro, Lima, Mandarino, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronjo (SL)	Psilido asiático de los cítricos ( <i>Diaphorina citri</i> ) Pulgón negro de los cítricos ( <i>Toxoptera aurantii</i> )	180 – 240 g / 100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 800 - 1000 L de agua / ha

\* ( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de aplicado el producto.

**LMR (Límite Máximo de Residuos):**

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Papa Jitomate Tomate de cáscara Chile	0.25	EPA*
Pepino Calabaza Calabacita Chayote Melón Sandía	0.2	EPA
Aguacatero	0.40	EPA
Limonero Cidro Lima Mandarino Naranja Pomelo Tangerino Toronjo	0.40	EPA

\*Environmental Protection Agency

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Al aplicar el producto deberá usar el equipo de protección indicado en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Para abrir el producto, rompa con tijeras en la esquina superior de la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad, posteriormente agregue **ACTRAM 75 WDG®** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersion, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".**

Durante las operaciones de manejo utilice ropa de protección adecuada: overol de algodón, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Una vez terminada la jornada laboral, lavar el equipo de seguridad y almacenarlo en el área de trabajo.



## **CONTRAINDICACIONES.**

Evite aplicar **ACTRAM 75 WDG®** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hr o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

## **FITOTOXICIDAD.**

**ACTRAM 75 WDG®** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con lo recomendado en esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD.**

No se recomienda **ACTRAM 75 WDG®** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

### **Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

### **Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

### **Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# **DRAGON®**

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)