



COATL 250 CE®

Fungicida agrícola

Concentrado emulsionable

PRODUCTO REGISTRADO: **RSCO-FUNG-0375-0716-009-26**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

DIFENOCONAZOLE: 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter
(Equivalente a 250 g de i.a. /L a 20°C)

26.00

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes y solvente

74.00

TOTAL

100.00

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5 PRECAUCIÓN, BANDA VERDE**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

COATL 250 CE® es un fungicida sistémico formulado como concentrado emulsionable. Se recomienda su uso para el control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre científico		
Plátano/ Banano (1)*	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	350 – 450	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha
Brócoli Col de Bruselas Col Coliflor (14)	Cenicilla Mancha foliar	<i>Erysiphe cruciferarum Alternaria brassicae</i>	400-600	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación 550-660 L de agua/ha
Pepino Melón Calabaza Calabacita Sandía Chayote (11)	Cenicilla Tizón foliar	<i>Erysiphe cichoracearum Alternaria cucumerina</i>	400-600	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación 550-660 L de agua/ha

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

Zarzamora Arándano Frambuesa Fresa (14)	Moho gris Mildiú	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Peronospora rubi</i>	400-600	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.
---	---------------------	--	---------	--

*() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

LMR(Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR(mg/kg)	FUENTE
Plátano/banano	0.2	EPA*
Brócoli Col de Bruselas Col Coliflor	2.0	EPA
Pepino Melón Calabaza Calabacita Sandía Chayote	0.70	EPA
Zarzamora Arándano Frambuesa Fresa	1.5 0.10 1.5 0.5	UE** UE UE UE

* Environmental Protection Agency **Unión europea

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, el envase debe ser abierto embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Girar presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase abra cuidadosamente el envase. Llene con agua hasta la mitad de agua de la capacidad del tanque de aspersion y posteriormente vierta lentamente la cantidad recomendada de **COATL 250 CE®**, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD: **COATL 250 CE®** no es fitotóxico al cultivo y en las dosis aquí indicadas, si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **COATL 250 CE®** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.